

Kanarie Rood en Geel intensief en schimmel

Rode kanaries worden meestal door beginnende liefhebbers mooi gevonden maar ze weten meestal niet hoe het verder moet de verzorging en kweek met van deze vogels.

De verzorging is het zelfde als alle kanaries , een goede zaadmengeling, eivoer, grit en badwater. Maar ook kleurstof dient toegevoegd worden door het drinkwater of eivoer. De hoeveelheid hangt af van de natuurlijke kleurdiepte van de vogels. Er zijn verschillende merken kleurstoffen in de dierenpecialzaak te koop.

Cantaxantine puur is de meest gebruikte kleurstof door de ervaren kwekers. Meestal gebruikt door het eivoer, in het drinkwater kan ook maar levert rode vlekken op in de kooi en omgeving doordat de vogels ook zich wassen in het drinkwater. Voor gele vogels is dit luteïne.



Om een zo goed mogelijk resultaat van kleurdiepte en egaliteit te krijgen moeten we zorgen dat de vogels de juiste hoeveelheid kleurstof binnen krijgen. In het water is het meestal geen probleem, maar in het eivoer kan het wel een probleem zijn. Neem daarom avonds het zaad weg voor dat de vogels slapen gaan. sMorgens geef je de vogels eivoer met kleurstof ze nemen dan voldoende kleurstof op. Na een paar uur plaats je het zaad weet terug zodat ze hier ook weer van kunnen eten. Bij gele vogels is dit minder het geval en daar geniet juist de voorkeur om het in het drinkwater te doen.



Rood ivoer intensief

De kweek:

Intensief, is een vogel die kort bevederd is en diep doorgekleurd in de bevedering.

Schimmel, is een vogel die langer bevederd is en aan de uiteinden van de bevedering een kleurloos randje laat zien.

Wil je intensieve vogels kweken let er dan op dat je geen intensief X intensief paart maar altijd een kort en een langer bevederde vogel. Het maakt niet uit of dit een man of pop is.



Roodivoor intensief en schimmel

De term die gehanteerd wordt is half intensief x intensief een vogel met zo weinig mogelijk kleurloze veer randjes en een diep door geleurde vogel met korte bevedering. Ook in de flanken.

Voor de schimmel kweek paren we een half intensieve vogel aan een schimmel vogel dit is een vogel met kleurloze veerrandjes.

Voor dat de paring plaatsvindt moet men beginnen met het voeren van kleurstof dit wordt ook in het ei opgenomen en de embryo krijgt zo al in de groei kleurstof mee. Dit geldt voor zowel rood als geel.

De kleurstof dient het hele jaar gegeven te worden zeker tot na de rui dagelijks daarna als onderhoud een paar keer per week.



Schimmel pop op de nest.